

## Silomaisreife

Die höchstmögliche Futterqualität kann nur erwartet werden, wenn folgende Ansprüche zur Silierreife erfüllt sind:

- gute Silierbarkeit und geringes Nacherwärmungsrisiko für eine hohe aerobe Stabilität
- hoher Anteil weitgehend ausgereifter Stärke
- hohe Verdaulichkeit der Restpflanze
- Abreife ohne Fusarium-Befall und Bildung von Pilzgiften.

Stärkegehalte und die Stärkequalitäten steigen nicht mehr nennenswert an, wenn der TM-Gehalt im Maiskorn 58–60 % erreicht hat. Die Silierbarkeit eines Maisbestands wird aber durch die fortschreitende Restpflanzenabreife begrenzt. Bei ausgesprochenen „dry down Sorten“ und in Jahren mit angespannter Wasserversorgung muss daher oft schon gehäckselt werden, bevor die Stärkeeinlagerung abgeschlossen ist. Nur Mais mit sehr hohen Kornanteilen und noch vitalen Restpflanzen („stay green Typ“) kann auch noch mit einem TM-Gehalt der Gesamtpflanze von bis zu 36 % aerob stabile Silage ergeben. Sorten mit rascher Restpflanzenabreife sollten selbst bei hohen Kornanteilen grundsätzlich deutlich früher gehäckselt werden. Als Grenzwert gelten 24–25 % TM-Gehalt der Restpflanze. Bei höheren TM-Gehalten in Blättern und Stängeln ist eine ausreichende Verdichtung im Silohaufen oftmals nicht mehr möglich. Das gilt insbesondere dann, wenn wie 2018 und 2019 oftmals mit niedrigen Kolbenanteilen geerntet werden muss. Die folgenden Empfehlungen für die Silomaisерnte berücksichtigen sowohl die höchstmögliche Energie- und Stärkeansammlung, die Restpflanzenabreife und ein noch tragbares Silierrisiko. Der Ziel-TM-Gehalt ist abhängig vom Kornanteil, der Körnerreife und dem Abreifegrad der Restpflanze, nicht generell vom Sortentyp.

### Empfehlungen zum optimalen Trockenmassegehalt (TM-Gehalt) bei der Ernte

Kornertragspotenzial des Bestands	Restpflanzenabreife	optimaler TM-Gehalt der Gesamtpflanze
hoch	langsam	34–36
hoch	schnell	30–32
niedrig	langsam	30–32
niedrig	schnell	28–30
<b>dürregeschädigter Mais</b>		
15–30 % Kolbenanteil	leicht grüne Blätter	26–28
fast ohne Kolben	noch 50 % grüne Blätter, 3–4 Wochen nach der Blüte	24–26

Wichtige Hinweise zum aktuellen Abreifegeschehen werden durch die gewohnten Abreifeuntersuchungen der Landwirtschaftskammer NRW gegeben und wöchentlich angepasst. Einzelbetriebliche Prognosen können auch im Internet unter [www.maisprog.de](http://www.maisprog.de) erstellt werden.



Alle Reifeprogno­sen und Beprobungen können die Kontrolle der Praxisbestände nicht ersetzen, geben aber deutliche Hinweise darauf, wann mit den Bestandsbeobachtungen begonnen werden sollte und wie schnell die Abreife voranschreiten kann. Bei der Beurteilung der Praxisbestände und der Terminierung der Ernte ist ein realistisches Einschätzen des Bestands hinsichtlich des Kolbenanteils und die Beobachtung der Restpflanzenabreife besonders wichtig. Zu einer recht sicheren Einschätzung des Trockenmassegehalts auf dem Feld kann folgendes Schema genutzt werden. Nach den Beobachtungen in 2018 und 2019 wurde die Tabelle dabei bezüglich der Restpflanzenabreife ergänzt, da nicht selten extrem vertrocknete Bestände mit TM-Gehalten von 30% und mehr in Blättern und Stängeln gehäckselt wurden. Bei extrem niedrigen Kolbenanteilen (20%) ist eine ausreichende Verdichtung bereits bei Gesamt-TM-Gehalten ab 28% oftmals nicht mehr gegeben.

### Reifeschätzung: Gesamt-TM-Gehalte in Abhängigkeit von Kolbenanteil und Abreife der Pflanze und Körner

Korn TM %	Kolben TM %	Konsistenz des Korns	Trockenkolbenanteil															
			extrem niedrig 20%				niedrig 40%				normal 50%				hoch 60%			
			TM in Restpflanze (%)															
			18 grün	20 mittel	25 strohig	30 tot	18 grün	20 mittel	25 strohig	30 tot	18 grün	20 mittel	25 strohig	30 tot	18 grün	20 mittel	25 strohig	30 tot
40	39	milchig-teigförmig	20,2	24,1	26,9	31,5	22,9	26,6	29,2	33,1	24,6	28,1	30,5	33,9	26,6	29,8	31,9	34,8
45	43	teigartig ohne Saftaustritt	20,4	24,4	27,3	31,9	23,5	27,3	30,0	34,1	25,4	29,1	31,6	35,3	27,6	31,1	33,4	36,6
50	47	Korn teilweise fest	20,5	24,6	27,6	32,3	23,9	27,9	30,8	35,1	26,0	30,0	32,6	36,6	28,6	32,3	34,8	38,3
55	51	Korn überwiegend fest	20,7	24,8	27,8	32,7	24,3	28,5	31,4	35,9	26,6	30,7	33,6	37,8	29,4	33,4	36,0	39,8
60	55	Korn ist hart	20,8	25,0	28,1	33,0	24,6	28,9	32,0	36,7	27,1	31,4	34,4	38,8	30,2	34,4	37,2	41,3

TM = Trockenmasse; korrigiert, nach Pioneer.